


YOUR GUIDE TO UNDERSTANDING THE MOST COMMON SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS (STIs)

STI

What's the story with these STIs?

TREATMENT



BACTERIAL VAGINOSIS

Call me BV for short. Although my actual cause is still unknown, an imbalance of vaginal bacteria sometimes brought on by douching, not using condoms during sex, or new or multiple sexual partner(s) can increase your chances of getting me. You can expect me to cause an off-white vaginal discharge with a fishy smell or nothing at all. I increase your risk of getting some other STIs.



TREATABLE W/
ANTIBIOTICS



CHLAMYDIA

I'm one of the most common STIs and affect people under age 25 at a high rate. Most women and men who catch me don't have symptoms so they don't know they have me and infect other people. I can cause serious problems like pelvic inflammatory disease (PID - read about PID on the next page), infertility and tubal pregnancy. Women under age 25 and men who have sex with men (MSM) should be tested at least yearly for me.




TREATABLE W/
ANTIBIOTICS



GENITAL WARTS

I'm caused by certain strains of HPV (read about HPV on the next page). I look like small, flesh-colored bumps that cluster together at the opening of the vagina or anus or on the penis and sometimes itch. There is a vaccination available to help prevent me.

Treatable with
prescription
creams, surgery,
laser or freezing
procedures.




GONORRHEA

Does the CLAP sound familiar? That's my nickname. Men who have me may have burning when they pee and yellow discharge from their penis. Women usually don't know they have me. Men who have sex with men (MSM) are at high risk of catching me. Women under age 25 and MSM should be tested at least yearly for me. Like Chlamydia, I can cause serious problems, like PID, tubal pregnancy and infertility.



TREATABLE W/
ANTIBIOTICS



HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV-1 & HSV-2)

I can be spread by touching another person who already has me, even if the person has no symptoms; this is called viral shedding. You can also become infected by touching one of my sores or the body fluids of an infected partner. After my first infection, I may come back from time to time in the form of small clusters of sores.

This infection
persists for life, BUT
antiviral
medication is
available to help
decrease transmission
to partner(s) and to
treat outbreaks.


PROTECT YOURSELF! These sexually transmitted infections are spread by unprotected oral, vaginal, &/or anal sex; OR contact with skin, bodily fluids, or sores of an infected person.

**HIV**

I spread through blood or bodily fluids of infected individuals, through shared drug needles, and/or from mother-to-baby during pregnancy, delivery or breastfeeding. In my initial stages I can cause severe flu-like symptoms. Treatment is important! Without treatment, I am the virus that can lead to AIDS.



**ANTIRETROVIRAL
THERAPY (ART)
MEDICATION**

**HUMAN PAPILLOMAVIRUS (HPV)**

I exist in 40 different strains that affect the anal and genital areas, some causing warts, the others causing pre-cancer and cancer. There are vaccinations for some strains and there are medications for removing warts caused by me.



**VACCINATION
FOR SOME TYPES,
MEDICATION FOR
WARTS**

**PELVIC INFLAMMATORY DISEASE (PID)**

I am usually caused by untreated Chlamydia or Gonorrhea. I cause infection and inflammation of the uterus, fallopian tubes and/or the ovaries. STI screening and early treatment of infections can reduce the risk of developing me so get tested regularly.



**TREATABLE W/
ANTIBIOTICS**

**SYPHILIS**

I am spread by blood and bodily fluids of infected individuals and/or through shared drug needles. I show symptoms in 4 stages: 1) Primary: single, painless sore that lasts 3-6 weeks; 2) Secondary: up to 180 days after the first sore I cause skin rashes, lesions in the mouth, vagina or anus; 3) Hidden Stage: this is caused when someone does not seek treatment and shows no additional symptoms; 4) Late Stage: this stage is dangerous and can cause damage to internal organs, including the brain.



**TREATABLE W/
ANTIBIOTICS**

**TRICHOMONIASIS**

I go by "Trick" and most of the time people (especially males) don't know I have infected them. When my symptoms do show up it is usually in women and I can cause vaginal discharge that might be a yellow-green color. I am spread by unprotected sex, so the best way to prevent me is by using condoms during sex.



**TREATABLE W/
ANTIBIOTICS**

YOUR HEALTH CARE PROVIDER WANTS YOU TO KNOW! Preventive methods (like condoms, vaccinations & STI testing) keep you safe from getting and spreading STIs. Go see them, they can help!

TU GUÍA PARA ENTENDER LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) MÁS COMUNES

ITS

¿QUÉ ONDA CON ESTAS ITS?

TRATAMIENTO



VAGINOSIS BACTERIANA

Llámame VB para abreviar. Aunque aún se desconoce la causa, un desequilibrio en las bacterias vaginales, a veces provocados por las duchas vaginales, el no usar condones, una pareja sexual nueva o múltiples parejas sexuales, pueden aumentar tus posibilidades de contagiarte conmigo. Puede que tengas un flujo vaginal de color blanquecino con un olor a pescado o nada en absoluto. Yo te aumento el riesgo de contraer cualquier otra ITS.



TRATABLE CON ANTIBIÓTICOS



CLAMIDIA

Soy una de las infecciones de transmisión sexual más comunes y afecto a las personas menores de 25 años a un ritmo elevado. La mayoría de las mujeres y los hombres que se contagian conmigo no tienen síntomas por lo que no saben que me tienen e infectan a otras personas. Puedo causar problemas graves, como la enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) (leer sobre EIP en la página siguiente), infertilidad y embarazo ectópico. Las mujeres menores de 25 años y los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) deben hacerse la prueba al menos cada año para saber si los he contagiado.




TRATABLE CON ANTIBIÓTICOS



VERRUGAS GENITALES

Soy causada por ciertas cepas de VPH (leer sobre VPH en la página siguiente). Luzco como protuberancias pequeñas, de color de piel que se agrupan juntos en la apertura de la vagina o el ano o en el pene y a veces causo picor. Hay una vacuna disponible para prevenirme.

Tratable con cremas recetadas, cirugías, laser, o procedimientos de frizado.




GONORREA

Los hombres que me tienen puede que sientan ardor al orinar y flujo amarillo por su pene. Las mujeres por lo general no saben que me tienen. Los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) se encuentran en alto riesgo de contagiarse conmigo. Las mujeres menores de 25 años y HSH se deben hacer la prueba para gonorrea, al menos cada año. Como la clamidia, yo puedo causar problemas graves, como la EIP, embarazo ectópico e infertilidad.



TRATABLE CON ANTIBIÓTICOS



VIRUS HERPES SIMPLEX (VHS-1 y VHS-2)

Yo me puedo propagar al tocar a otra persona que tiene el virus, incluso si la persona no tiene síntomas; esto se llama diseminación viral. Te puedo infectar si tocas una de mis llagas o los fluidos corporales de una persona infectada. Después de mi primera infección, yo puedo volver a aparecer de vez en cuando en forma de pequeños grupos de llagas.

Síntomas de esta infección continúan por vida, **PERO** hay medicamentos antivirales disponibles para ayudar a disminuir la transmisión a tu pareja(s) y para tratar los brotes.


¡PROTÉGETE A TI MISMO! ESTAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL SE TRANSMITEN POR SEXO SIN PROTECCIÓN VAGINAL, ORAL O ANAL; O POR CONTACTO CON LA PIEL, FLUIDOS CORPORALES O LLAGAS DE UNA PERSONA INFECTADA.

**VIH**

Yo me transmito a través de la sangre o los fluidos corporales de los individuos infectados, a través de compartir agujas para inyectarse drogas, y/o de la madre al bebé durante el embarazo, el parto o la lactancia. En mis etapas iniciales puedo causar síntomas severos similares a la gripe. ¡El tratamiento es importante! Sin tratamiento, yo soy el virus que causa el SIDA.



**TRATABLE CON
TERAPIA
ANTIRRETROVIRAL
(TAR)**

**VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH)**

Existo en 40 cepas diferentes que afectan las áreas anal y genital, algunos causan verrugas, los otros causan lesiones precancerosas y el cáncer. Hay vacunas para algunas cepas y existen medicamentos para eliminar las verrugas causadas por mí.



**VACUNAS PARA
ALGUNOS TIPOS,
MEDICAMENTO PARA
LAS VERRUGAS**

**ENFERMEDAD PELVICA INFLAMATORIA (EPI)**

Usualmente soy causada por clamidia o gonorrea no tratada. Yo provocho la infección y la inflamación del útero, trompas de Falopio y/o los ovarios. La detección de ITS y tratamiento de infecciones en estadios tempranos puede reducir el riesgo de mi desarrollo, así que hazte las pruebas para ITS con regularidad.



**TRATABLE CON
ANTIBIÓTICOS**

**SIFILIS**

Soy transmisible por contacto directo con una llaga de sífilis en los genitales, la vagina, el ano, el recto, o la boca. Mujeres embarazadas pueden transmitir sífilis a su feto. Muestro síntomas en 4 etapas: 1) Primaria: única llaga sin dolor que tiene una duración de 3-6 semanas; 2) Secundario: hasta 180 días después de la primera llaga causa erupciones en la piel, lesiones en la boca, la vagina o el ano; 3) Etapa oculta: esto ocurre cuando alguien no busca tratamiento y no muestra síntomas adicionales; 4) Fase tardía: esta etapa es peligrosa y puede causar daños en los órganos internos, incluyendo el cerebro.



**TRATABLE CON
ANTIBIÓTICOS**

**TRICOMONIASIS**

Respondo por "Tric" y la mayoría de las veces la gente (especialmente los varones) no saben que los he infectado. Cuando mis síntomas se presentan es por lo general en mujeres y puedo causar flujo vaginal que podría ser de un color amarillo-verde. Soy transmisible por sexo sin protección, por lo que la mejor manera de prevenir mi transmisión es mediante el uso de condones durante sexo.



**TRATABLE CON
ANTIBIÓTICOS**

¡TU PROVEEDOR DE CUIDADOS DE SALUD QUIERE QUE SEPAS! Los métodos preventivos (como condones, vacunas, pruebas de detección de ITS) te mantienen libres de contraer y transmitir ITS. ¡Visítalos, ellos te pueden ayudar!

Sexually Transmitted Infection/Disease (STD/STI) Rates in Clark County

Gonorrhea




Figure 1 Rate of new gonorrhea diagnosis in Clark County, 2018-2021.

Chlamydia




Figure 2 Rate of new chlamydia diagnosis in Clark County, 2018-2021.

Syphilis




Figure 3 Rate of new syphilis diagnosis in Clark County, 2018-2021.

HIV




Figure 4 Rate of new HIV diagnosis in Clark County, 2018-2021.

All 4 STI/STD

Table 1 Rate of new STI/STD diagnosis in Clark County, 2018-2021.

	2018	2019	2020	2021
Gonorrhea	270.6	282.7	340.1	269.7
Chlamydia	619.2	603.4	491.5	442.1
Syphilis	26.8	26.8	59.7	75.0
HIV	7.4	5.2	3.7	8.9